


Themen



[zur Themenseite Coronavirus](#)

(allgemeine Infos)

Die Infoseite fasst Hinweise zur Anwendung und Verordnung von oral anwendbaren antiviralen Medikamenten zur Behandlung von COVID-19-Patient:innen zusammen.

Aktuelle Hinweise:

Paxlovid länger haltbar

Paxlovid®-Filmtabletten können sechs Monate über das aufgedruckte Datum hinaus angewendet werden. Betroffen sind Packungen auf denen ein Verfallsdatum bis einschließlich Mai 2023 aufgedruckt ist. Weitere Informationen und eine Übersicht der betroffenen Verfallsdaten gibt die [KBV-PraxisNachricht](#).

Lagevrio® darf nicht mehr verordnet und verabreicht werden ([Praxis-News 28.02.2023](#))

Allgemeine Hinweise zur Verordnung:

- Die Medikamente sollen zur Behandlung von symptomatischen, nicht hospitalisierten Patienten mit COVID-19 ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf eingesetzt werden.
- Patient:innenindividuelle Verordnungen erfolgen auf Muster 16 Formular zu Lasten BAS IK 103609999 möglich.
- Paxlovid®: Seit dem 18. August 2022 können niedergelassene hausärztliche Allgemeinmediziner:innen und Internist:innen bis zu fünf Therapieeinheiten bzw. Packungen je Praxis beschaffen und bevorraten (siehe [Praxis-News 23.08.2022](#)).

Arzneimittel, Wirkstoff und Zulassungsstatus	Aktuelle Verfügbarkeit zur ambul. Versorgung	Prophylaxe	Therapie	Ergänzende Hinweise
Lagevrio® Molnupiravir nicht zugelassen Produktinfo	Nein Praxis-News 28.02.2023	Nein	Nein Praxis-News 28.02.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Therapiebeginn innerhalb von 5 Tagen nach Symptombeginn • Laut RKI ist im indirekten Vergleich zu anderen Wirkstoffen die Wirksamkeit geringer. Empfehlung: Auf Lagevrio® zurückgreifen, Paxlovid® nicht in Frage kommt. Weitere Informationen beim RKI • Bundesregierung übernimmt die Produkthaftung • weitere Information auch zur Bestellung, Abrechnung usw. finden Sie hier

Arzneimittel, Wirkstoff und Zulassungsstatus	Aktuelle Verfügbarkeit zur ambul. Versorgung	Prophylaxe	Therapie	Ergänzende Hinweise
Paxlovid® Nirmatrelvir/ Ritonavir zugelassen Produktinfo	Ja seit 25.02.2022	Nein	Ja	<ul style="list-style-type: none"> • frühzeitige Anwendung innerhalb von 5 Tagen nach Symptombeginn • 5-tägige Behandlungsdauer auch im Falle einer Hospitalisierung des Patient/-in einhalten • aufgrund vielfacher Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen/Kontraindikationen sorgfältiger Interaktionscheck vor Verordnung zwingend erforderlich • Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) verweist auf Artikel im New England Journal of Medicine: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Patient:innen ≥65 Jahren => signifikant geringere Hospitalisierungs- und Todesrate, ◦ bei Jüngeren kein Beweis für einen Nutzen, ◦ weitere Informationen zur Studie • Weitere Informationen und zum Vorgehen bei der Covid-19-Medikation der Fachgruppe COVRIIN des RKI entnehmen • weitere Informationen zur Bestellung, Abrechnung usw. finden Sie hier • detaillierte Informationen zu Kontraindikationen/WW finden Sie hier

Kontakt für Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen

[Service-Center der KV Berlin](#)

[FAQ: Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen](#)

Kontakt für Patient:innen

Wann hilft die KV Berlin?

Terminservice:

[Weitere Informationen und Termine](#)

[buchen](#)

Kontakt für Presseanfragen

presse@kvberlin.de



BERLIN

Kassenärztliche Vereinigung
Berlin
Masurenallee 6A
14057 Berlin

[030 / 31 003-0](tel:030310030)
[030 / 31 003-380](tel:03031003380)
[Kontakt](#)